

Tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica

Classe		Apresentação	Posologia	Efeitos adversos
Diuréticos tiazídicos	Hydrochlorothiazida	12,5 mg comprimido 25 mg comprimido	12,5-50 mg 1x ao dia	Hiperuricemia e aumento de crises de gota Intolerância aos carboidratos hipocalcemia
Diuréticos de alça	Furosemida	40 mg comprimido	20 - 320 mg 1x ao dia	Hipopotassemia, hipovolemia (com ototoxicidade), prováveis manifestações que podem incluir síncope
Diuréticos poupadores de potássio	Espironolactona	25 mg comprimido 100 mg comprimido	12,5mg- 100mg 1 x ao dia	Hiperpotassemia, Ginecomastia e diminuição da libido com espironolactona
Inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA)	Captopril	25 mg comprimido	12,5-50 mg 1x ao dia	Tosse; efeitos teratogênicos Angioedema, modificação do paladar, hiperpotassemia, piora da função renal em presença de estenose bilateral de artéria renal ou unilateral em rim único
	Maleato de Enalapril	5 mg comprimido 10 mg comprimido 20 mg comprimido	10 - 40 mg 1 ou 2x ao dia (24h/24h ou 12/12h)	
	Para prevenção secundária em pacientes com insuficiência cardíaca ou cardiopatia isquêmica; menos eficaz que diuréticos na ausência de doença cardiovascular			
Bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos	Anlodipino	5 m comprimido 10 mg comprimido	2,5 mg - 10 mg 1 x dia	Palpitações, edema de membros inferiores

Tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica

Classe		Apresentação	Posologia	Efeitos adversos
Betabloqueadores beta e alfa	Carvedilol	3,125 mg comprimido 6,25 mg comprimido 12,5 mg comprimido	6,25 – 25 mg 2 x ao dia (12/12h)	Hipotensão, síncope e palpitações (especialmente na primeira dose), fraqueza
Betabloqueadores seletivos	Succinato de metoprolol	25 mg comprimido de liberação prolongada 50 mg comprimido de liberação prolongada 100 mg comprimido de liberação prolongada	50-200 mg 1 x ao dia (24/24h)	
	Tartarato de metoprolol	100 mg comprimido	100-200 mg 2 x ao dia (12/12h)	
Betabloqueadores não seletivos	Cloridrato de propranolol	10 mg comprimido 40 mg comprimido	50-200 mg 1 vez ao dia	
Bloqueadores do receptor de angiotensina	Losartana	50 mg comprimido		Hiperpotassemia, diminuição da função renal em presença de estenose bilateral de artéria renal ou em rim único
	Para prevenção secundária em pacientes com insuficiência cardíaca ou cardiopatia isquêmica; menos eficaz que diuréticos na ausência de doença cardiovascular			
Segunda e terceira escolha (considerando diurético como primeira)				
Vasodilatadores diretos	Cloridrato de Hidralazina	25 mg comprimido 50 mg comprimido		Hipotensão postural, palpitações, cefaleia